

¡Ayude a su mascota a sanar!

durante los próximos 7 a 10 días



©2023 ASPCA*. Todos los derechos reservados.



¡Sin lamer!

Lamer o morder la incisión puede provocar una infección.

Revisar la incisión

Lo que ves hoy es normal. Revise dos veces al día si hay enrojecimiento, hinchazón o secreción.

(El pequeño tatuaje verde indica que se esterilizó o se castró.)

Mantenga la incisión seca

El agua afecta al pegamento quirúrgico y abre la incisión, provocando una infección.



Las incisiones en los machos



Se localizan justo enfrente del escroto.

Separe los animales



Mantenga a las hembras alejadas de los machos sin castrar.

Restringir la actividad

El descanso en el interior le da tiempo al tejido para sanar y ayuda a que la incisión se mantenga cerrada.

(¡Sin correr, brincar o jugar!)

Alimentar con una dieta sencilla

No le dé a su mascota comida chatarra, golosinas para animales, sobras ni leche.



¡Sin medicación humana!

Es peligroso y puede ser fatal. Su mascota ya recibió analgésicos de acción prolongada.



Comuníquese con nosotros de inmediato si nota:

Encías pálidas; depresión; problemas para caminar; pérdida de apetito o disminución de la toma de agua; vómitos; diarrea; secreción o sangrado en la incisión; dificultad para orinar o defecar; dificultades para respirar.

